

Deze tabel behoort bij het artikel:

Kevers van dood hout

Kris Vandekerckhove, Luc Crêvecoeur, Arno Thomaes & Frank Köhler

Themanummer Ongewervelden en natuurbeheer, De Levende Natuur, 114de jaargang nummer 5: 182-186.

Tabel 1. Overzicht van de waargenomen doodhoutkevers (aangegeven met '1') die op de Duitse Rode Lijst (Geiser et al., 1998) zijn opgenomen RL(D).

Categorieën:

- 1 = met uitsterven bedreigd;
- 2 = bedreigd;
- 3 = kwetsbaar.

Hab = habitat waar de soorten aan gebonden zijn:

- H = hout;
- M = houtmoolm;
- P = houtzwammen;
- R = schors;
- N = nesten in holten;
- S = sap uitvloeï.

Soorten met een * zijn urwaldreliktsoorten.

Soort	Kolmombos	Meerdaalwoud	Zoniënwoud	RL(D)	Hab
Spiegelkevers - Histeridae					
<i>Plegaderus dissectus</i> Er., 1839	1	1	1	3	M
<i>Abraeus granulum</i> Er., 1839	1	1	1	3	M
<i>Abraeus parvulus</i> Aubé, 1842*	1	-	-	2	M
<i>Aeletes atomarius</i> (Aube, 1842)*	1	1	1	1	M
Cholevidae					
<i>Nemadus colonoides</i> (Kr., 1851)	1	1	-	3	N
Truffelkevers- Leiodidae					
<i>Liodopria serricornis</i> (Gyll., 1813)	1	1	-	3	P
Valse Knotskevers - Scydmaenidae					
<i>Neuraphes ruthenus</i> Mach., 1925	-	1	-	3	M
<i>Scydmorephes minutus</i> (Chaud., 1845)	-	-	1	2	M
<i>Microscydmus minimus</i> (Chaud., 1845)	1	1	1	3	M
<i>Scydmaenus perrisii</i> Rtt., 1881	1	1	-	2	N
Veervleugelkevers - Ptiliidae					
<i>Nossidium pilosellum</i> (Marsh., 1802)	1	-	1	3	M
<i>Ptenidium gressneri</i> Er., 1845	1	1	1	3	M
<i>Micridium halidaii</i> (Matth., 1868)*	1	-	-	3	M
<i>Ptinella denticollis</i> (Fairm., 1857)	1	-	-	1	M
<i>Baeocrara variolosa</i> (Muls.Rey, 1867)	-	1	-	3	P

Soort	Kolmombos	Meerdaalwoud	Zoniënwoud	RL(D)	Hab
Kortschildkevers - Staphylinidae					
<i>Siagonium quadricorne</i> Kirby, 1815	1	1	1	3	R
<i>Scaphisoma balcanicum</i> Taman., 1954	1	-	-	3	P
<i>Phyllocrepa nigra</i> (Grav., 1806)	1	-	-	3	N
<i>Phloeonomus minimus</i> (Er., 1839)	1	1	1	2	R
<i>Phyllocrepoidea crenata</i> Ganglb., 1895	1	1	1	3	R
<i>Hypnogyra glabra</i> (Nordm., 1837)	1	1	1	3	M
<i>Quedius dilatatus</i> (F., 1787)	1	1	1	3	N
<i>Quedius truncicola</i> Fairm.Lab., 1856	-	1	1	3	N
<i>Quedius infuscatus</i> Er., 1840	-	1	-	2	N
<i>Quedius brevicornis</i> Thoms., 1860	1	1	-	3	M
<i>Sepedophilus bipustulatus</i> (Grav., 1802)	-	-	1	1	M
<i>Tachinus bipustulatus</i> (F., 1792)	-	1	-	2	S
<i>Holobus apicatus</i> (Er., 1837)	1	1	1	3	P
<i>Gyrophana polita</i> (Grav., 1802)	1	-	-	3	P
<i>Agaricochara latissima</i> (Steph., 1832)	1	1	1	3	P
<i>Cyphea curtula</i> (Er., 1837)	-	1	-	2	R
<i>Euryusa sinuata</i> Er., 1837	-	1	-	3	N
<i>Thamiaraea cinnamomea</i> (Grav., 1802)	1	1	1	3	S
<i>Thamiaraea hospita</i> (Märk., 1844)	1	-	-	2	S
<i>Euplectus infirmus</i> Raffr., 1910	-	1	1	2	M
<i>Plectophloeus erichsoni</i> (Aubé, 1844)	-	1	1	2	M
<i>Plectophloeus rhenanus</i> (Rtt., 1881)	-	1	-	1	M
<i>Trichonyx sulcicollis</i> (Reichb., 1816)	1	1	1	3	M
<i>Batrissodes buqueti</i> (Aube, 1833)*	1	-	-	2	N
<i>Batrissodes unisexualis</i> Bes., 1988	1	1	1	3	N
<i>Batrissodes oculatus</i> (Aube, 1833)	1	-	-	1	N
Mierkevers - Cleridae					
<i>Tillus elongatus</i> (L., 1758)	1	1	1	3	H
Kniptorren - Elateridae					
<i>Elater ferrugineus</i> L. 1758*	1	-	-	2	M
<i>Ampedus nigroflavus</i> (Goeze, 1777)	1	1	1	3	M
<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacord., 1835)	1	-	-	2	M
<i>Procaerus tibialis</i> (Lacord., 1835)	1	-	-	2	M
<i>Hypogonus inunctus</i> (Lacord., 1835)	-	-	1	3	H
<i>Stenagostus rhombeus</i> (Ol., 1790)	1	1	1	3	M
Spinthoutkevers - Cerophytidae					
<i>Cerophytum elateroides</i> (Latr., 1804)	1	1	-	2	H
Schijnkniptorren - Eucnemidae					
<i>Isorhipis melasoides</i> (Cast., 1835)	-	-	1	2	H
<i>Eucnemis capucina</i> Ahr., 1812	1	1	1	3	H
<i>Dromaeolus barnabita</i> (Villa, 1838)	1	1	1	2	H
<i>Dirhagus pygmaeus</i> (F., 1792)	1	-	-	3	H
<i>Dirhagus lepidus</i> (Rosh., 1847)	1	1	1	3	H
<i>Hylis olexai</i> Palm, 1955	1	1	1	3	H
<i>Hylis cariniceps</i> Rtt., 1902	-	-	1	3	H
Lissomidae					
<i>Drapetes cinctus</i> (Panz., 1796)	1	-	1	3	H
Spektorren - Dermestidae					
<i>Globicornis nigripes</i> (F., 1792)	-	1	-	3	N
<i>Megatoma undata</i> (L., 1758)	1	1	1	3	N
<i>Trinodes hirtus</i> (F., 1781)	1	-	-	3	N

Soort	Kolmombos	Meerdaalwoud	Zoniënwood	RL(D)	Hab
Prachtzwamkevers - Erotylidae					
<i>Triplax rufipes</i> (F., 1775)	1	1	1	1	P
<i>Dacne rufifrons</i> (F., 1775)	1	-	-	2	P
Houtkoolzwamkevers - Biphyllidae					
<i>Biphyllus lunatus</i> (F., 1792)	1	-	-	1	P
Harige Schimmelkevers - Cryptophagidae					
<i>Cryptophagus labilis</i> Er., 1846	1	-	-	2	M
<i>Atomaria elongatula</i> Er., 1846	1	-	-	3	P
Dwergschorskevers - Laemophloeidae					
<i>Laemophloeus monilis</i> (F., 1787)	-	1	-	3	R
Schimmelkevers - Latridiidae					
<i>Latridius hirtus</i> (Gyll., 1827)	1	1	1	3	P
<i>Enicmus brevicornis</i> (Mannh., 1844)	1	1	1	3	P
<i>Enicmus testaceus</i> (Steph., 1830)	1	1	1	2	P
<i>Stephostethus pandellei</i> (Bris., 1863)	1	-	-	3	P
<i>Corticaria alleni</i> Johns., 1974	1	1	1	2	R
Boomzwamkevers - Mycetophagidae					
<i>Triphyllus bicolor</i> (F., 1792)	1	1	1	3	P
<i>Mycetophagus ater</i> (Rtt., 1879) *	-	-	1	1	P
<i>Mycetophagus piceus</i> (F., 1792)	1	1	1	3	P
<i>Mycetophagus multipunctatus</i> F., 1792	-	1	1	3	P
<i>Mycetophagus populi</i> F., 1798	1	-	-	2	P
Somberkever - Zopheridae					
<i>Cicones variegatus</i> (Hellw., 1792)	1	-	-	3	P
<i>Cicones undatus</i> (Guer., 1844)	1	1	1	3	P
<i>Colydium elongatum</i> (F., 1787)	1	1	-	3	R
Molmkogeltjes - Corylophidae					
<i>Arthrolips obscurus</i> (Sahlb., 1833)	-	-	1	2	R
<i>Orthoperus nigrescens</i> Steph., 1829	1	1	-	2	R
Zwamkevers - Endomychidae					
<i>Symbiotes latus</i> Redt., 1849	-	1	-	2	M
<i>Symbiotes gibberosus</i> (Luc., 1849)	1	1	-	2	M
Houtzwamkevers - Ciidae					
<i>Ropalodontus perforatus</i> (Gyll., 1813)	1	1	1	3	P
<i>Orthocis pygmaeus</i> (Marsh., 1802)	1	1	-	3	P
Klopkevers - Anobiidae					
<i>Grynobius planus</i> (F., 1787)	1	-	1	3	H
<i>Ochina ptnoides</i> (Marsh., 1802)	1	1	-	3	H
<i>Gastrallus laevigatus</i> (Ol., 1790)	1	-	-	2	H
<i>Anobium denticolle</i> (Creutz., 1796)	1	1	1	3	H
<i>Mesocoelopus niger</i> (Müll., 1821)	1	-	-	3	H
<i>Dorcatoma chrysomelina</i> Sturm, 1837	1	1	1	3	H
<i>Dorcatoma dresdensis</i> Hbst., 1792	1	-	1	3	P
<i>Dorcatoma robusta</i> Strand, 1938	1	1	1	2	P
Platsnuitkevers - Salpingidae					
<i>Rabocerus gabrieli</i> (Gerh., 1901)	-	1	-	2	R

Soort	Kolmombos	Meerdaalwoud	Zoniënwood	RL(D)	Hab
Bloemspartelkevers - Scraptiidae					
<i>Scraptia fuscata</i> Müll., 1821	1	-	-	3	H
<i>Anaspis lurida</i> Steph., 1832	1	1	1	3	H
<i>Anaspis ruficollis</i> (F., 1792)	-	1	-	2	H
<i>Anaspis garneysi</i> Fowl., 1889	1	1	-	1	H
Schijnsnoerhalskevers - Aderidae					
<i>Euglenes oculus</i> (Payk., 1798)	1	1	1	2	M
Spartelkevers - Mordellidae					
<i>Mordella aculeata</i> L., 1758	-	1	-	3	H
Zwamspartelkevers - Melandryidae					
<i>Abdera flexuosa</i> (Payk., 1799)	-	-	1	3	P
<i>Phloiotrya rufipes</i> (Gyll., 1810)	1	-	1	3	H
<i>Melandrya caraboides</i> (L., 1761)	1	1	1	3	H
Tetratomidae					
<i>Tetratoma ancora</i> F., 1790	1	-	1	3	P
Zwartlijven - Tenebrionidae					
<i>Allecula morio</i> (F., 1787)	1	-	-	3	M
<i>Allecula rhenana</i> Bach, 1856*	1	-	-	2	M
<i>Prionychus ater</i> (F., 1775)	1	1	1	3	M
<i>Pseudocistela ceramoides</i> (L., 1761)	1	-	-	2	M
<i>Bolitophagus reticulatus</i> (L., 1767)	1	1	1	3	P
<i>Platydemus violaceum</i> (F., 1790)	1	-	-	3	P
<i>Pentaphyllus testaceus</i> (Hellw., 1792)	1	1	1	3	M
<i>Corticeus bicolor</i> (Ol., 1790)	1	-	1	3	R
Bladspruitkevers - Scarabaeidae					
<i>Gnorimus nobilis</i> (L., 1758)	-	-	1	3	M
<i>Trichius zonatus</i> Germ., 1831	1	-	-	3	H
Boktorren - Cerambycidae					
<i>Leptura aurulenta</i> (F., 1792)	1	-	-	2	H
<i>Corymbia scutellata</i> (F., 1781)	-	-	1	3	H
<i>Obrium cantharinum</i> (L., 1767)	1	-	-	2	R
<i>Xylotrechus rusticus</i> (L., 1758)	-	1	-	2	H
<i>Plagionotus detritus</i> (L., 1758)	1	1	-	2	R
<i>Mesosa nebulosa</i> (F., 1781)	-	1	-	3	H
<i>Exocentrus adspersus</i> Muls., 1846	1	1	1	3	H
Boksnuitskevers - Anthribidae					
<i>Choragus sheppardi</i> Kirby, 1818	1	-	1	3	P
Snuitkevers – Curculionidae (Scolytinae & Platypodinae)					
<i>Kissophagus hederae</i> (Schmitt, 1843)	1	1	-	3	R
<i>Taphrotychus villifrons</i> (Duf., 1843)	-	1	-	2	R
<i>Platypus cylindrus</i> (F., 1792)	1	1	1	3	H
Totaal					
	94	76	65		