

Vijftig jaar broedvogels van de Drentsche Aa

Bijlage 1

Aantallen (gemiddelden per periode) van broedvogels in het beekdal van de Drentsche Aa (3800 ha, zie fig. 1).

Soort	61-70	71-80	81-90	91-00	00-10	11-13	
Dodaars	+	7	0,0	4,5	5,8	11,0	
Fuut	+	2	2,0	1,5	3,8	3,3	
Geoorde Fuut	0	0	0,0	0,0	0,0	0,3	
Blauwe Reiger	3	14	4,0	5,0	2,0	0,0	
Roerdomp	1	0	0,0	0,0	0,5	1,5	
Ooievaar	0	0	0,0	1,0	1,9	6,0	
Knobbelzwaan	?	1	0,0	3,5	3,5	2,7	
Kolgans	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	
Grauwe Gans	0	0	0,0	0,0	0,7	16,7	
Canadese Gans	0	0	0,0	1,0	9,2	16,7	
Brandgans	0	0	0,0	0,0	0,2	1,3	
Nijlgans	0	0	2,0	10,8	24,1	28,7	
Casarca	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	
Bergeend	?	5	3,0	4,3	1,4	1,0	
Krakeend	0	0	0,0	0,0	2,1	8,0	
Wintertaling	?	17	14,6	7,6	1,9	4,0	
Wilde Eend*	+	+	20,6	20,7	24,8	18,3	
Zomertaling	+	5	2,0	2,6	0,8	0,3	
Slobeend	+	7	4,0	3,0	4,6	5,7	
Tafeleend	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	
Kuifeend	0	1	8,4	15,2	16,1	19,0	
Bruine Kiekendief	+	4	4,0	3,0	1,0	1,0	
Havik**	0	1	10,0	11,0	5,0	2,0	
Sperwer**	0	2	3,0	7,0	3,0	1,0	
Buizerd	0	6	16,8	39,0	29,1	23,5	
Torenvalk	+	35	21,0	23,1	5,9	2,0	
Boomvalk	0	0	1,0	1,0	1,1	0,0	
Patrijs	+	48	7,3	6,2	1,1	1,3	
Kwartel	?	1	9,2	5,3	10,5	30,3	
Fazant*	+	+	6,5	5,7	2,2	5,7	
Waterral	0	0	0,0	1,5	6,8	16,0	
Porseleinhoen	?	1	1,0	0,0	1,3	2,0	
Kwartelkoning	+	4	3,7	4,3	6,9	7,3	
Waterhoen	+	+	+	+	16,3	18,3	
Meerkoet	+	+	+	+	41,4	39,0	
Scholekster	61	180	163,2	97,9	33,2	15,3	
Kleine Plevier	0	0	0,0	0,0	1,2	0,7	
Kievit	408	373	322,6	256,9	112,6	88,7	

* Alleen in vier proefvlakken (zie artikel).

** Ook in bossen langs randen beekdal.

*** Maxima per periode.

Aantallen (gemiddelden per periode) van broedvogels in het beekdal van de Drentsche Aa (3800 ha, zie fig. 1).

Soort	61-70	71-80	81-90	91-00	00-10	11-13	
Kemphaan	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Watersnip	143	100	106,9	102,5	123,9	113,7	
Houtsnip	0	1	0,2	1,0	4,5	9,7	
Grutto	588	368	218,5	100,8	39,7	19,3	
Wulp	31	56	68,0	79,0	57,0	30,8	
Kokmeeuw***	480	700	450,0	157,0	170,0	7,0	
Visdief***	?	2	0,0	6,0	2,0	2,0	
Zwarte Stern***	7	20	5,0	1,0	0,0	0,0	
Tureluur	20	51	54,1	44,8	36,4	26,3	
Holenduif	+	+	36,1	31,5	24,6	43,5	
Houtduif*	+	+	18,5	22,9	25,2	28,0	
Turkse Tortel	+	+	+	+	0,8	0,8	
Zomertortel	+	+	26,2	9,3	2,1	3,8	
Koekoek	+	25	24,1	29,9	32,1	39,3	
Kerkuil	+	+	+	+	+	+	
Steenuil	+	+	+	+	+	+	
Bosuil	0	0	0,0	1,0	2,1	1,3	
Ransuil	+	+	3,2	2,3	1,6	1,0	
Ijsvogel	?	2	0,0	0,0	5,0	0,3	
Groene Specht	+	10	0,8	2,8	10,5	22,0	
Grote Bonte Specht	+	10	38,2	43,3	70,9	112,0	
Kleine Bonte Specht	?	1	4,5	22,5	20,4	25,2	
Veldleeuwerik	+	62	67,7	50,0	39,5	65,7	
Oeverzwaluw***	+	100	0,0	41,0	34,0	5,0	
Boerenzwaluw*	+	+	6,5	3,2	2,1	2,0	
Huiszwaluw	+	+	+	+	12,8	6,7	
Boompieper	?	26	87,7	258,7	382,9	559,8	
Graspieper	+	84	134,9	206,8	347,4	390,2	
Gele Kwikstaart	+	6	25,0	18,5	23,6	47,0	
Witte Kwikstaart*	+	+	12,8	13,6	12,7	17,0	
Winterkoning*	+	+	40,6	52,7	67,6	52,3	
Heggenmus*	+	+	6,3	15,3	22,2	29,3	
Roodborst*	+	+	28,3	34,3	34,3	35,7	
Nachtegaal	+	3	4,2	2,0	0,4	0,3	
Blauwborst	0	0	0,0	0,0	32,5	70,7	
Zwarte Roodstaart	+	+	7,5	5,6	3,6	3,7	
Gekraagde Roodstaart	+	28	117,0	135,2	97,2	124,7	
Paapje	+	23	43,0	22,3	11,6	7,7	
Roodborsttapuit	2	3	3,0	29,1	142,4	243,7	
Merel*	+	+	36,9	52,4	74,6	97,7	
Zanglijster*	+	+	11,0	18,2	29,1	33,7	

* Alleen in vier proefvlakken (zie artikel).

** Ook in bossen langs randen beekdal.

*** Maxima per periode.

Aantallen (gemiddelden per periode) van broedvogels in het beekdal van de Drentsche Aa (3800 ha, zie fig. 1).

Soort	61-70	71-80	81-90	91-00	00-10	11-13	
Grote Lijster	+	+	45,0	35,6	25,8	33,7	
Sprinkhaanzanger	0	0	10,1	6,7	40,7	109,7	
Rietzanger	+	15	9,0	10,2	11,8	23,3	
Bosrietzanger	+	+	156,6	113,7	181,6	203,0	
Kleine Karekiet	+	+	7,5	20,7	51,9	84,3	
Spotvogel	+	16	24,5	14,7	15,4	16,2	
Braamsluiper	+	+	4,9	14,2	14,1	13,8	
Grasmus	+	142	198,4	530,1	555,2	811,0	
Tuinfluiters*	+	+	31,8	35,9	31,1	51,0	
Zwartkop*	+	+	19,1	27,6	49,4	79,7	
Fluiter	0	0	0,0	0,7	1,2	1,8	
Tjiftjaf*	+	+	45,3	61,9	61,1	88,3	
Fitis*	+	+	72,1	79,3	87,1	139,3	
Grauwe Vliegenvanger	+	+	33,4	26,5	26,8	39,8	
Bonte Vliegenvanger*	+	+	2,3	3,4	4,8	6,0	
Staatmees*	+	+	5,2	8,0	8,1	8,0	
Glanskop	+	3	2,1	1,1	0,6	0,3	
Matkop*	+	+	9,6	8,8	6,7	8,7	
Pimpelmees*	+	+	23,5	29,3	40,0	39,0	
Koolmees*	+	+	42,4	47,5	49,2	55,3	
Boomklever	0	0	0,0	0,1	19,2	28,8	
Boomkruiper	+	+	53,5	92,9	111,7	158,7	
Buidelmees	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	
Wielewaal	+	5	7,0	11,7	17,4	15,3	
Grauwe Klauwier	0	0	1,1	4,5	22,5	38,0	
Gaai*	+	+	7,0	6,8	8,8	12,3	
Ekster*	+	+	1,5	1,1	0,3	0,0	
Kauw*	+	+	2,3	7,5	2,3	0,0	
Roek	0	0	0,0	0,0	2,4	0,0	
Zwarte Kraai*	+	+	8,9	18,1	12,2	10,0	
Spreeuw*	+	+	8,7	17,0	15,1	9,0	
Huismus*	+	+	5,3	15,8	23,4	33,0	
Ringmus*	+	+	3,6	3,9	6,1	4,7	
Vink*	+	+	54,4	67,2	83,2	98,0	
Groenling*	+	+	1,4	3,4	13,9	12,7	
Putter	0	0	0,0	1,5	43,2	46,5	
Kneu	+	84	12,5	57,1	68,2	70,0	
Kleine Barmsijs	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	
Goudvink	+	3	5,8	3,8	14,4	21,3	
Appelvink	0	0	1,2	4,6	6,3	9,7	
Geelgors	+	25	87,3	126,1	247,4	338,7	
Rietgors	+	41	74,6	97,3	306,1	327,8	

* Alleen in vier proefvlakken (zie artikel).

** Ook in bossen langs randen beekdal.

*** Maxima per periode.